Bulletin n° 15 du 25 juin 1996

Pyrale du maïs :

les résultats du

modèle PRESEPT?

retardés.

Traitements chimiques

Enquête: Utilisez-vous

GRANDES CULTURES

Maïs

Pyrale

Les premiers papillons ont été capturés le 20 juin. La chute des températures de ces derniers jours retardera de quelques jours les dates des traitements chimiques. Elles devraient se situer désormais entre le : - 5 et 10 juillet dans le sud-ouest meusien,

- 8 et 13 juillet dans la majorité de la Lorraine, y compris secteurs de Vittel, Neufchateau dans les Vosges, - 15 et 20 juillet dans les secteurs plus tardifs (Pays Haut, Plateaux du Barrois et Haye, secteurs des Vosges autre que Vittel, Neufchateau).

Les dates restent inchangées pour ce qui concerne les lâchers de trichogrammes (TR 16).

Colza

Alternaria

Ouelques taches ont été observées sur feuille en Meuse notamment. Les températures trop froides, l'arrêt des précipitations ne sont plus favorables au champignon.

Tout traitement est désormais inutile.

Blé

Pucerons

Leur nombre reste inférieur au seuil de nuisibilité. Le stade de sensibilité est atteint par les blés les plus avancés (stade grain pâteux).

Les traitements spécifiques devraient être inutiles cette année.

> MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION REGIONALE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél.: 83.30.41.51

KE - Publication périodique CPPAP Nº 2011 AD - Toute reproduction, mêne partielle, est soumise à notre autorisation - ISSN 0980 - 8507 Imprimerie de la DRAF - Directeur-gérant : D. VERBE

ABONNEMENT ANNUEL



QUESTIONNAIRE «FONGICIDES BLE»

((*): entourez la bonne réponse)

S.R.P.V. Lorraine A renvoyer le plus rapidement possible à :

38, rue Sainte Catherine 54 043 NANCY Cedex (ou par fax n° 83 32 00 45)

•Nom de votre commune :

Département :

(*) • Cette année, combien de traitements fongicides blé avez-vous réalisé? (sur la majorité des blés de votre exploitation)

> 3 2 1

date de T1 -• Date de chaque traitement fongicide:

date de T2 -

date de T3 -

• Produit(s) utilisé(s) lors de T1 -

T2 -

T3 -

demi dose Autres (précisez): (*) ● Dose appliquée à T1 pleine dose 2/3 dose

> pleine dose demi dose Autres (précisez): à T2 2/3 dose

> Autres (précisez): demi dose pleine dose 2/3 dose à T3

(*) Connaissez-vous PRESEPT, le modèle de prévision de l'évolution de la septoriose du blé développé par le SPV?

> OUI NON

(*) ● Si oui, suivez-vous les préconisations de ce modèle **OUI** NON

Depuis combien d'années ? 2 ans 3 ans 1 an